



Behandling med benzbromaron

Hvad er benzbromaron?

Benzbromaron er det virksomme stof i præparatet af samme navn.

Hvilke sygdomme behandles med

Benzbromaron?

Benzbromaron har været kendt og brugt gennem mange år i andre lande til behandling af urinsyregigt, men er ikke markedsført i Danmark. Du kan derfor IKKE slå benzbromaron op på en række danske hjemmesider f.eks. www.medicin.dk. Der vil ligeledes mangle en dansk indlægsseddel, når du får præparatet udleveret på apoteket.

Hvordan virker benzbromaron?

Benzbromaron øger udskillelsen af urinsyre gennem nyrerne og sænker derved også niveauet af urinsyre i blodet. Dette resulterer på sigt i af dine symptomer forsvinder. Benzbromaron virker derimod ikke på akutte anfald af urinsyregigt.

Hvor længe gives behandlingen?

Behandlingen er som udgangspunkt livslang, da benzbromaron ikke fjerner årsagen til din forhøjede urinsyre i blodet, men alene nedsætter niveauet.

Hvordan tages behandlingen?

Behandlingen er individuel og afhænger af dine blodprøver, symptomer og eventuelle bivirkninger.

Benzbromaron fås i tabletter på 100mg og de fleste får behandling svarende til en dosis på 50-200mg dagligt. Du skal følge de anvisninger, du har fået af din læge.

Husk at drikke rigeligt med væske, mindst 2 liter dagligt, få at undgå nyresten

Hvordan opbevares benzbromaron?

Benzbromaron opbevares bedst i den originale emballage beskyttet mod fugt. Opbevares ved stuetemperatur.

Hvis jeg har glemt at tage Benzbromaron

Hvis du har glemt at tage benzbromaron skal du blot tage hvad du vanligt tager på den pågældende dag og ikke tage dobbelt dosis for at "kompensere" for eventuelt glemte doser dagen i forvejen.

Bivirkninger

De fleste tåler behandlingen med benzbromaron uden problemer. Dog kan der forekomme bivirkninger. Den hyppigste bivirkning er opblussen af din urinsyregigt. Denne forværring skyldes at urinsyren i blodet ændrer sig (falder), når du tager benzbromaron, og dette kan fremprovokere ledanfald. Denne forværring er midlertidig og kan lindres eller modvirkes ved samtidig ordination af betændelsesdæmpende medicin (oftest colchicin). Henvend dig til din læge, hvis du oplever forværring af gigten, og ikke har noget anfaldsmedicin, der lindrer forværringen.

Af andre bivirkninger kan nævnes:

- Diarré
- Kvalme

Sjældent:

- Hududslæt
- Nyresten
- Leverpåvirkning



Forholdsregler når du er i behandling med benzbromaron

Rejser

Vi anbefaler, at du kontakter dit forsikrings-selskab forud for udlandsrejser, når du er i behandling med benzbromaron.

Øvrigt

Der forventes ikke pauser i behandlingen. Særligt bør du IKKE holde pause i behandlingen med benzbromaron, hvis du får et anfald med ledsmerter. Du bør også fortsætte behandlingen ved anden sygdom (som fx feber).

Benzbromaron og anden medicin

- Warfarin (f.eks. Marevan) skal gives i mindre dosis end vanligt ved samtidig behandling med benzbromaron
- Acetylsalicylsyre (f.eks. Magnyl eller Aspirin) nedsætter potentielt virkningen af benzbromaron
- Fluconazol øger koncentrationen af benzbromaron og bør undgås

Generelt anbefaler vi at du snakker med din læge omkring brug af anden medicin sammen med benzbromaron.

Graviditet og amning

Bør ikke benyttes af gravide eller ammende.

Hvis du ønsker at blive gravid, anbefaler vi at du planlægger graviditeten i samråd med din reumatolog.

Blodprøvekontrol

Variere, men ofte tages der blodprøver hyppigt efter opstart af behandlingen og ved evt. optrapning for at kontrollere niveauet af urinsyre i blodet, og for at sikre at du kan tåle behandlingen.

Blodprøveresultaterne bliver set, og du bliver efterfølgende kontaktet, hvis der er behov for det.

Yderligere spørgsmål?

Er du i tvivl eller har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte dit behandlingssted.