



Behandling med febuxostat

HANDELSNAVN: _____

Hvad er febuxostat?

Febuxostat er det virksomme stof i præparater som f.eks. Adenuric.

Hvilke sygdomme behandles med febuxostat?

Febuxostat bruges mod urinsyreigt, også kaldet podagra eller arthritis urica. Midlet er ikke egnet til at behandle akutte anfald, men til at forebygge at nye anfald opstår.

Hvordan virker febuxostat?

Febuxostat nedsætter produktionen af urinsyre i kroppen, så indholdet af urinsyre i dit blod bliver mindre og aflejringer af urinsyre i dine led vil efterhånden forsvinde. Hyppigheden af dine anfald vil derfor falde og dine anfald vil til sidst ophøre.

Hvor længe gives behandlingen?

Behandlingen er som udgangspunkt livslang, da febuxostat ikke fjerner årsagen til din forhøjede urinsyre i blodet, men alene behandler niveauet ned.

Hvordan tages febuxostat?

Febuxostat findes som tabletter og fås i styrkerne 80 mg og 120 mg. Oftest er startdosis 40 mg dagligt (1/2 tablet) og trappes så langsomt op indtil behandlingsmålet for din urinsyre i blodet er nået.

Hvordan opbevares febuxostat?

Febuxostat opbevares bedst i den originale emballage beskyttet mod fugt. Opbevares ved stuetemperatur.

Hvis jeg har glemt at tage febuxostat

Hvis du glemmer at tage en tablet, skal du ikke tage to på én gang. Tag i stedet din næste tablet på det tidspunkt du plejer, og fortsæt som før.

Bivirkninger

De fleste tåler behandlingen med febuxostat uden problemer. Dog kan der forekomme bivirkninger. Den hyppigste bivirkning er opblussen af din urinsyreigt. Denne forværring skyldes at urinsyren i blodet ændrer sig (falder), når du tager febuxostat, og dette kan fremprovokere anfald i gigten. Denne forværring er midlertidig og kan lindres eller modvirkes ved samtidig ordination af betændelsesdæmpende medicin (oftest colchicin). Henvend dig til din læge, hvis du oplever forværring af gigten og ikke har noget anfaldsmedicin, der lindrer forværringen.

Af andre bivirkninger kan nævnes:

- Mavegener (diarré, kvalme eller opkastning)
- Hovedpine
- Udslæt på huden
- Meget sjældent ses påvirkning af nyre, lever eller knoglemarv

Du kan læse en samlet oversigt over bivirkninger i indlægssedlen, som ligger i pakken med medicin.



Forholdsregler når du er i behandling med febuxostat

Rejser

Vi anbefaler, at du kontakter dit forsikringsselskab forud for udlandsrejser, når du er i behandling med febuxostat.

Øvrigt

Der forventes ikke pauser i behandlingen. Særligt bør du IKKE holde pause i behandlingen med febuxostat, hvis du får et anfald med ledsmerter. Du bør også fortsætte behandlingen ved anden sygdom (som fx feber).

Febuxostat og anden medicin

Febuxostat kan påvirke virkningen af anden medicin og omvendt. Vær særlig opmærksom, hvis du tager:

- Azathioprin (anvendes bl.a. mod gigt)
- Mercaptopurin (anvendes mod kræft)

Vi anbefaler, at du taler med din læge om at bruge anden medicin sammen med febuxostat.

Smertestillende medicin

Du må gerne tage smertestillende medicin som f.eks. paracetamol og ibuprofen sammen med febuxostat og colchicin.

Graviditet og amning

Bør ikke benyttes af gravide eller ammende.

Hvis du ønsker at blive gravid, anbefaler vi at du planlægger graviditeten i samråd med din reumatolog.

Blodprøvekontrol

I starten vil du blive indkaldt til regelmæssige blodprøvekontroller – dette for at sikre at din urinsyre i blodet falder til et passende niveau og at du kan tåle medicinen.

Tilskud

Du vil normalt være berettiget til tilskud til behandling med febuxostat. Din reumatolog vil notere dette på din recept.

Yderligere spørgsmål?

Er du i tvivl eller har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte dit behandlingssted. Derudover henviser vi til indlægssedlen i pakken med medicin.